BISCO

CORE-FLO™ DC Lite *Dual-Cured*

Low Viscosity Core Build-Up

Instructions for Use

CE 0459

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

BISCO Europe
208, allée de la Coudouolette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-218R8
Rev. 9/21

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

en CORE-FLO™ DC Lite
Low Viscosity Core Build-Up

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC Lite is a flowable dual-cured, radiopaque core build-up composite, specifically designed to cement posts and build-up the core structure in one easy application. **CORE-FLO DC Lite** is also an ideal dentin replacement material. **CORE-FLO DC Lite** is available in dual-syringe, 12 g packages in both Natural/A1 & Opaque White shades. **CORE-FLO DC Lite** is intended for use with a bonding agent that is compatible with dual-cured materials, such as BISCO adhesives.

Intended user: licensed dentist.

Indications for use:
The principle indications for use of **CORE-FLO DC Lite** are:
1. Core build-up/repair
2. Cementation of posts or pins
3. Dentin replacement material

Warnings:
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using dental adhesives, contamination will significantly reduce bonding and may result in decreased longevity of the restoration.
- A rubber dam is recommended for all indications where isolation is possible.

Cautions:
- Core-contamination: Product may contain items that are designed for one-time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, sterilize or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Pesses:
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (methyl) acrylates may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should not be placed in the syringe barrel. If used intraorally, wipe mixing tip with disinfectant prior to placing in barrel.

Unlike Bisco adhesives, not all dual- or light-cured or self-etch systems bond to self-cured or dual-cured materials. Refer to the manufacturer's instructions.
- Isolate the core build-up for taking impressions or fabricating temporary crowns/bridges. (Use only sufficient to moisten it thoroughly). In order to prevent inhibition, wipe the surface:
  - If refrigerated, product should be brought to room temperature before use.
  - Use individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Instructions for Use available upon request.
- Instructions for Use available at www.bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION

At room temperature (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Working Time: Maximum 1 minute
Setting Time: Maximum 7 minutes
Working time and Setting time may vary based on storage conditions, temperature, humidity, etc.

INSTRUCTIONS FOR USE

CORE MATERIAL MIXING PROCEDURES:
1. Remove the syringe cap or mixing tip from the dual-syringe.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the tabs and keyway. Then the brown locking mechanism will engage.
4. Pressing the plunger will mix and dispense the **CORE-FLO DC Lite** (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

1. CORE BUILD-UP USING CORE-FLO DC Lite
(Tooth preparation)
(1) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of a light-cured adhesive.
(2) If using a matrix band, place a matrix band around the prepared tooth. Place the end of the tip of the syringe directly on to the preparation and dispense **CORE-FLO DC Lite**. Light cure for 40 seconds.
b.If using a core form: place the mixing tip directly into the core form and dispense **CORE-FLO DC Lite**. Place the loaded core form onto the prepared tooth and hold in place until the material sets.
(4) Prepare and finish the core in the usual manner.

2. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP TECHNIQUE USING CORE-FLO DC Lite
(1) Try-in the selected fiberpost fit according to the post manufacturer's instructions.
(2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO light-cured adhesive, we recommend the use of a light paper point into the paper point reservoir dry from the bottle and apply air dry the adhesive to the canal. Light cure.
NOTE: The paper point step is important for removal of any pooled adhesive so that there is no polymerization in complete seating of the post.
(3) Coat the surface of the post with an adhesive according to the manufacturer's instructions. This will increase the wettability of the post.
(4) Using the root canal mixing tip, dispense **CORE-FLO DC Lite** into the canal. Fill only the apical end of the canal and withdraw the tip slowly while dispensing the core cement to minimize voids.
(5) Coat the apical end of the post with **CORE-FLO DC Lite**. Seat the post into the canal gently and maintain light pressure for 30-60 seconds until the post is seated.
(6) Continue to express **CORE-FLO DC Lite** around the post and build up the core to the desired height and shape.
(7) Remove the excess material and light cure for 40 seconds by placing the light tip as close as possible to the post and core build-up.
(8) Prepare and finish the core in the usual manner.

3. DENTIN REPLACEMENT MATERIAL
(1) Isolate tooth and prepare in a conservative manner.
(2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO light-cured adhesive, we recommend the use of a light paper point into the paper point reservoir dry from the bottle and apply air dry the adhesive to the canal.
NOTE: The paper point step is important for removal of any pooled adhesive so that there is no polymerization in complete seating of the post.
(3) Coat the surface of the post with an adhesive according to the manufacturer's instructions. This will increase the wettability of the post.
(4) Using the root canal mixing tip, dispense **CORE-FLO DC Lite** into the canal. Fill only the apical end of the canal and withdraw the tip slowly while dispensing the core cement to minimize voids.
(5) Coat the apical end of the post with **CORE-FLO DC Lite**. Seat the post into the canal gently and maintain light pressure for 30-60 seconds until the post is seated.
(6) Continue to express **CORE-FLO DC Lite** around the post and build up the core to the desired height and shape.
(7) Remove the excess material and light cure for 40 seconds by placing the light tip as close as possible to the post and core build-up.
(8) Prepare and finish the core in the usual manner.

3. DENTIN REPLACEMENT MATERIAL
(1) Isolate tooth and prepare in a conservative manner.

es CORE-FLO™ DC Lite
Low Viscosity Core Build-Up

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC Lite ist ein fließfähiges, dual-ausgehärtetes, röntgendichtes Stumpfaufbaukomposit, das speziell zur Zementierung von Stiften und für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einzigen, einfachen Anwendung vorgesehen ist. Es wurde speziell zur Zementierung von Stiften entwickelt und ist für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einfachen, einzigen Anwendung. **CORE-FLO DC Lite** ist außerdem ein ideales Dentinersatzmaterial. **CORE-FLO DC Lite** wird in Doppelspritzen, 12 g Packungen, Natural und in der Farbe A1 und Opaque White erhältlich. **CORE-FLO DC Lite** ist für die Verwendung mit einem Haftvermittler bestimmt, der mit dualhärtenden Materialien, wie z. B. Adhäsiven von BISCO, kompatibel ist.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Indikationen für den Gebrauch:
Die grundlegenden Indikationen für den Gebrauch von **CORE-FLO DC Lite** sind:
1. Stumpfaufbau/material
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
- Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Die der Verwendung von Dentaladhäsiven wird die Dentinhaftung, auch bei Verwendung von Produkten und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. erheblich verringern.
- Für alle Indikationen, bei denen eine Kontamination möglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Warnhinweise:
- Kontaminationen:
  - Das Produkt kann Komponenten enthalten, die für einen einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht reinigen, sterilisieren oder wiederverwenden.
  - Es wird empfohlen, eine Spritzenhülle aus gängigem Schutzfolie zu verwenden, um eine Kontamination der Spritze vorzubeugen. Wenn eine Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
- Vermeiden Hautkontakt; unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen verursachen. Im Falle eines Kontakts, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Die Mischkammer der Doppelspritze an ihrer Stelle zur nächsten Aufbringung lassen, um Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Bei intraoraler Verwendung der Spritzen wischen Sie die Mischkammer mit Desinfektionsmittel ab, bevor sie wieder in die Spritze einsetzen.

Im Gegensatz zu den Adhäsiven von Bisco binden nicht alle dual- oder lichtgehärteten oder selbstätzenden an selbsthärtende oder dualhärtende Materialien. Beim Hersteller bitte die Anweisungen nachlesen.
- Den Stumpfaufbau für die Anfertigung des Abdrucks oder die Herstellung von provisorischen Kronen/Brücken (ein gründliches Durchfeuchten kann evtl. ausreichen), isolieren. Um eine Hemmung zu vermeiden, die Oberfläche wischen:
  - Wenn das Produkt im Kühlschrank aufbewahrt wird, muss es vor Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden.
  - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  - Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.bisco.com.
  - Gebrauchsanweisung auf Anfrage erhältlich.
  - Gebrauchsanweisung verfügbar auf www.bisco.com.

INFORMATIONEN TECHNIQUES

Bei Raumtemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Verarbeitungszeit: Höchstens 1 Minute
Verarbeitungszeit und Abbindezeit können je nach Lagerbedingungen, Feuchtigkeit, Temperatur usw. variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

VERFAHREN ZUM ANMISCHEN DES RECHNUNGSMATERIALS:
1. Die Spritzenkappe oder Mischkanule von der Doppelspritze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock geben, um Lufteinschlüsse in den Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Mischkanule zum Ausrichtung des Keils auf der Kerbung an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verriegelungsmechanismus in Eingriff drehen.
4. Durch Drücken, um das **CORE-FLO DC Lite** zu mischen und zu dispensieren (Siehe "TECHNISCHE INFORMATIONEN" Abschnitt für Verarbeitungs- und Abbindezeiten sind den Abschnitt "TECHNISCHE INFORMATIONEN" zu entnehmen).

1. STUMPFAUFBAU MIT CORE-FLO DC Lite
(1) Den Zahn durch Anlegen eines Kofferdams isolieren.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs.
(3) Falls eine Matrix verwendet wird, eine Matrix um den präparierten Zahn legen. Das Ende der Mischkanule direkt auf die Präparation anwetzen und **CORE-FLO DC Lite** abgeben. 40 Sekunden lang lichtgehärten.
b. Bei Verwendung einer Stumpfform: Die Mischkanule direkt in die Stumpfform einführen und **CORE-FLO DC Lite** abgeben. Die gefüllte Stumpfform über den präparierten Zahn aufsetzen und 40 Sekunden lang unter Beibehaltung des Drucks halten.
(4) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

2. VERFAHREN FÜR DIE STIFTZEMENTIERUNG UND DES STUMPFAUFBAUS MIT CORE-FLO DC Lite
(1) Den Zahn isolieren und gemäß den Anweisungen des Stiftherstellers anprobieren.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs von BISCO. Vor den Lichthärten den Überschuss mit Papierspitzen aufnehmen. Die Papierspitzen sind jeweils einmal zu verwenden. Anschließend das Adhäsiv lufttrocknen lassen, damit das Lösungsmittel verdampft.
HINWEIS: Das Trocknen mit Papierspitzen ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass der Kanal vor dem Einsetzen des Stiftes vollständig trocken ist.
(3) Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auf den Stift auftragen.
(4) Mit der Wurzelkanal-Mischkanüle **CORE-FLO DC Lite** in den Wurzelkanal abgeben. Die Füllung beginnen und die Spitze langsam zurückziehen. Dabei den Zm in einer Richtung, um Lufteinschlüsse minimal zu halten.
(5) Auf die apikale Ende des Stifts **CORE-FLO DC Lite** auftragen. Den Stift vorsichtig in den Kanal einsetzen und 20 bis 30 Sekunden lang einen leichten Druck auf den Stift ausüben.
(6) Fortfahren, **CORE-FLO DC Lite** rund um den Stift herauszudrücken und den Stumpf auf die gewünschte Höhe und Form aufbauen.
(7) Überschüssiges Material entfernen und 40 Sekunden lang unter Lichtbestrahlung aushärten. Dabei die Lichtspitze so nah wie möglich an den Stift und den Stumpfaufbau heranbringen.
(8) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

3. DENTINERSATZMATERIAL
(1) Den Zahn isolieren und auf die herkömmliche Art und Weise präparieren. Anschließend abgedeckt trocknen.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs.
(3) **CORE-FLO DC Lite** frei von Luft in die Höhle der Dentin-Ersatzmasse abgeben. 40 Sekunden lichtgehärten.
(4) Das **CORE-FLO DC Lite**-Produkt 30 Sekunden lang unter Lichtbestrahlung aushärten. Das lichtgehärtete Komposit weiterhin entfernen. Bis die Kariesfreiheit gefüllt ist Anschließend gemäß den Herstellerangaben unter Lichtbestrahlung aushärten.
(5) Die Okklusion überprüfen und mit dem Finierer und Polieren fertigstellen.

HYGIENE: Die Mischkanüle der Doppelspritze an ihrer Stelle bis zur nächsten Anwendung lassen. Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Zur Verwendung von Kanülenmischern der Spritzen wischen der Behandlung wird die Verwendung von handdesinfizierbare Hygienekontrollkappen. Die Verwendung der Mischkanüle vor der Lagerung mit einer Wischdesinfektionsmittel.

ENTSORGUNG: Durch eine Mischkanüle hergestellter Zement sollte nicht wiederverwendet werden. Es ist ein einem Mischkanüle verwendeter Zement bestimmt abschnittweise lichthärten, bis es vollständig ausgehärtet ist. Entsorgen Sie Spritze, Spitzen und ausgehärtetes Material gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Abfallbestimmungen oder den örtlichen Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

LAGERUNG: Mit bei Raumtemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F) lagern. Bei Temperaturen über 30 °C/86°F ist eine Qualitätsbeeinträchtigung möglich.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt ihre Verpflichtung zum Ersatz, wie hierbeschrieben. Produkten an BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder Verluste, der Ausgaben oder Verbindlichkeiten aus dieser Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung liegt es der Entscheidung des Anwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Alle Produkte dürfenmit alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

* CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc.

Um Zubehör nachzubestellen:
X-81252P – Statische Anmischspitzen für Doppelspritzen (30)
X-81253P – Statisch- und intraorale Spitzen für Doppelspritzen (20)
X-81267P – Anmisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (20)

HINWEIS: Melden Sie jeden schweren Vorfall an Bisco und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

fr CORE-FLO™ DC Lite
Stumpfaufbaumaterial mit niedriger Viskosität

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC Lite ist ein fließfähiges, dual ausgehärtetes, röntgendichtes Stumpfaufbaukomposit, das speziell zur Zementierung von Stiften und für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einzigen, einfachen Anwendung vorgesehen ist. Es wurde speziell zur Zementierung von Stiften entwickelt und ist für den Aufbau der Stumpfstruktur in einer einfachen, einzigen Anwendung. **CORE-FLO DC Lite** ist außerdem ein ideales Dentinersatzmaterial. **CORE-FLO DC Lite** wird in Doppelspritzen, 12 g Packungen, Natural und in der Farbe A1 und Opaque White erhältlich. **CORE-FLO DC Lite** ist für die Verwendung mit einem Haftvermittler bestimmt, der mit dualhärtenden Materialien, wie z. B. Adhäsiven von BISCO, kompatibel ist.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Indikationen für den Gebrauch:
Die grundlegenden Indikationen für den Gebrauch von **CORE-FLO DC Lite** sind:
1. Stumpfaufbaumaterial
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
- Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Die der Verwendung von Dentaladhäsiven wird die Dentinhaftung, auch bei Verwendung von Produkten und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. erheblich verringern.
- Für alle Indikationen, bei denen eine Kontamination möglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Warnhinweise:
- Kontaminationen:
  - Das Produkt kann Komponenten enthalten, die für einen einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht reinigen, sterilisieren oder wiederverwenden.
  - Es wird empfohlen, eine Spritzenhülle aus gängigem Schutzfolie zu verwenden, um eine Kontamination der Spritze vorzubeugen. Wenn eine Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
- Vermeiden Hautkontakt; unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen verursachen. Im Falle eines Kontakts, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Die Mischkammer der Doppelspritze an ihrer Stelle zur nächsten Aufbringung lassen, um Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Bei intraoraler Verwendung der Spritzen wischen Sie die Mischkammer mit Desinfektionsmittel ab, bevor sie wieder in die Spritze einsetzen.

Im Gegensatz zu den Adhäsiven von Bisco binden nicht alle dual- oder lichtgehärteten oder selbstätzenden an selbsthärtende oder dualhärtende Materialien. Bitte die Anweisungen des Herstellers nachlesen.
- Den Stumpfaufbau für die Anfertigung des Abdrucks oder die Herstellung von provisorischen Kronen/Brücken (ein gründliches Durchfeuchten kann evtl. ausreichen), isolieren. Um eine Hemmung zu vermeiden, die Oberfläche wischen:
  - Wenn das Produkt im Kühlschrank aufbewahrt wird, muss es vor Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden.
  - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  - Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.bisco.com.
  - Gebrauchsanweisung auf Anfrage erhältlich.
  - Gebrauchsanweisung verfügbar auf www.bisco.com.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Bei Raumtemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Verarbeitungszeit: Maximum 1 Minute
Verarbeitungszeit und Abbindezeit können je nach Lagerbedingungen, Feuchtigkeit, Temperatur usw. variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

VERFAHREN ZUM ANMISCHEN DES RECHNUNGSMATERIALS:
1. Die Spritzenkappe oder Mischkanule von der Doppelspritze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock geben, um Lufteinschlüsse in den Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Mischkanule zum Ausrichtung des Keils auf der Kerbung an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verriegelungsmechanismus in Eingriff drehen.
4. Durch Drücken, um das **CORE-FLO DC Lite** zu mischen und zu dispensieren (Siehe "TECHNISCHE INFORMATIONEN" Abschnitt für Verarbeitungs- und Abbindezeiten sind den Abschnitt "TECHNISCHE INFORMATIONEN" zu entnehmen).

1. STUMPFAUFBAU MIT CORE-FLO DC Lite
(1) Den Zahn durch Anlegen eines Kofferdams isolieren.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs.
(3) Falls eine Matrix verwendet wird, eine Matrix um den präparierten Zahn legen. Das Ende der Mischkanule direkt auf die Präparation anwetzen und **CORE-FLO DC Lite** abgeben. 40 Sekunden lang lichtgehärten.
b. Bei Verwendung einer Stumpfform: Die Mischkanule direkt in die Stumpfform einführen und **CORE-FLO DC Lite** abgeben. Die gefüllte Stumpfform über den präparierten Zahn aufsetzen und 40 Sekunden lang unter Beibehaltung des Drucks halten.
(4) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

2. VERFAHREN FÜR DIE STIFTZEMENTIERUNG UND DES STUMPFAUFBAUS MIT CORE-FLO DC Lite
(1) Den Zahn isolieren und gemäß den Anweisungen des Stiftherstellers anprobieren.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs von BISCO. Vor den Lichthärten den Überschuss mit Papierspitzen aufnehmen. Die Papierspitzen sind jeweils einmal zu verwenden. Anschließend das Adhäsiv luftrocknen lassen, damit das Lösungsmittel verdampft.
HINWEIS: Das Trocknen mit Papierspitzen ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass der Kanal vor dem Einsetzen des Stiftes vollständig trocken ist.
(3) Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auf den Stift auftragen.
(4) Mit der Wurzelkanal-Mischkanüle **CORE-FLO DC Lite** in den Wurzelkanal abgeben. Die Füllung beginnen und die Spitze langsam zurückziehen. Dabei den Zm in einer Richtung, um Lufteinschlüsse minimal zu halten.
(5) Auf die apikale Ende des Stifts **CORE-FLO DC Lite** auftragen. Den Stift vorsichtig in den Kanal einsetzen und 20 bis 30 Sekunden lang einen leichten Druck auf den Stift ausüben.
(6) Fortfahren, **CORE-FLO DC Lite** rund um den Stift herauszudrücken und den Stumpf auf die gewünschte Höhe und Form aufbauen.
(7) Überschüssiges Material entfernen und 40 Sekunden lang unter Lichtbestrahlung aushärten. Dabei die Lichtspitze so nah wie möglich an den Stift und den Stumpfaufbau heranbringen.
(8) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

3. DENTINERSATZMATERIAL
(1) Den Zahn isolieren und auf die herkömmliche Art und Weise präparieren. Anschließend abgedeckt trocknen.
(2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstellerangaben auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines lichtgehärteten Adhäsivs.
(3) **CORE-FLO DC Lite** frei von Luft in die Höhle der Dentin-Ersatzmasse abgeben. 40 Sekunden lichtgehärten.
(4) Das **CORE-FLO DC Lite**-Produkt 30 Sekunden lang unter Lichtbestrahlung aushärten. Das lichtgehärtete Komposit weiterhin entfernen. Bis die Kariesfreiheit gefüllt ist Anschließend gemäß den Herstellerangaben unter Lichtbestrahlung aushärten.
(5) Die Okklusion überprüfen und mit dem Finierer und Polieren fertigstellen.

HYGIENE: Die Mischkanule der Doppelspritze an ihrer Stelle bis zur nächsten Anwendung lassen. Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Zur Verwendung von Kanülenmischern der Spritzen wischen der Behandlung wird die Verwendung von handdesinfizierbare Hygienekontrollkappen. Die Verwendung der Mischkanule vor der Lagerung mit einer Wischdesinfektionsmittel.

ENTSORGUNG: Durch eine Mischkanule hergestellter Zement sollte nicht wiederverwendet werden. Es ist ein einem Mischkanule verwendeter Zement bestimmt abschnittweise lichthärten, bis es vollständig ausgehärtet ist. Entsorgen Sie Spritze, Spitzen und ausgehärtetes Material gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Abfallbestimmungen oder den örtlichen Bestimmungen nicht gibt, befolgen Sie die nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

LAGERUNG: Mit bei Raumtemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F) lagern. Bei Temperaturen über 30 °C/86°F ist eine Qualitätsbeeinträchtigung möglich.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt ihre Verpflichtung zum Ersatz, wie hierbeschrieben. Produkten an BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder Verluste, der Ausgaben oder Verbindlichkeiten aus dieser Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung liegt es der Entscheidung des Anwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Alle Produkte dürfenmit alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

* CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc.

Um Zubehör nachzubestellen:
X-81252P – Statische Anmischspitzen für Doppelspritzen (30)
X-81253P – Statisch- und intraorale Spitzen für Doppelspritzen (20)
X-81267P – Anmisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (20)

it CORE-FLO™ DC Lite
Materiale da riempimento fluido a bassa viscosità per la ricostruzione di monconi

INFORMAZIONI GENERALI

CORE-FLO DC Lite è un composito fluido a polimerizzazione duale, radiopaco, per la ricostruzione dei monconi, specificamente progettato per cementare i perni e ricostruire la struttura del nucleo in una semplice applicazione. **CORE-FLO DC Lite** è inoltre un materiale ideale come sostitutivo della dentina. **CORE-FLO DC Lite** è disponibile in siringhe a doppia applicazione, 12 g nelle tinte Naturale/A1 come Bianco Opaco. **CORE-FLO DC Lite** è stato progettato per essere usato con un adesivo compatibile con materiali polimerizzanti duali, come gli adesivi BISCO.

Utilizzatore previsto: Chirurgen-Dentiste diplomé.

Indicazioni per l'uso:
Le principali indicazioni di uso de **CORE-FLO DC Lite** sono le seguenti:
1. Materiale per la ricostruzione di monconi
2. Cementazione di perni o pivots
3. Materiale per rimpiazzare la dentina

Avvertenze:
- Durante queste procedimenti se deve evitare la contaminazione da saliva, sangue o acqua. Le che adesivi adhesivi odontologici, la contaminazione compromettono l'adhesion sul la dentina e diminuisce la longevità della restaurazione.
- L'utilizzo della diga di gomma è caldeggiato in tutte le indicazioni in cui sia possibile isolare.

Precauzioni:
- Contaminazione cruciale:
  - Il prodotto può contenere componenti che sono ad uso unico. Deseche le parti usate o contaminate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
  - Se raccomanda l'uso di protezione igieniche facilmente disponibili para evitar la contaminazione. Se las jeringas se han contaminado, se recomienda que se desechen. Se recomienda que se desechen. Se recomienda que se desechen. No lo limpie ni desinfecte.

Precauzioni:
- Evitare il contatto con la pelle; (metil) acrilati resinas no polimerizzato possono causare sensibilizzazione nelle persone suscettibili. En caso de contacto, lava la zona con jabón y agua.
- Para evitar la polimerización o la obstrucción, la punta mezcladora de la jeringa de aplicación doble no debe estar en el cañón de la jeringa. Si se utiliza intraralmente, limpie la punta mezcladora con desinfectante antes de almacenarla.
- A diferencia de los adhesivos Bisco, no todos los sistemas de fotopolimerización o autocurados se adhieren a materiales de auto-curado o curado dual. Consulte las instrucciones del fabricante.
- Aislar la reconstrucción del muñón para realizar impresiones o para fabricar provisionales temporales (puede que solo necesite humedecerlo bien); para evitar la inhibición, limpie la superficie:
  - Si está refrigerado, el producto debe alcanzar la temperatura ambiente antes de ser usado.
  - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
  - La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.
  - Las instrucciones de uso están a disposición.
  - Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Generalmente a temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F):
Tempo de trabajo: Minimo 1 minuto
Tempo de fraguado: Máximo 7 minutos
El tempo de manipulação y el tempo de fraguado pueden variar según las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA DEL MATERIAL:
1. Retire el capuchón de la jeringa o la mezcla de la doble jeringa.
2. Coloque una pequeña cantidad de material en un mezclador para eliminar los vacíos existentes en cada cámara de la doble jeringa.
3. Conecte una punta de mezcla a la doble jeringa alineando las lengüetas y la ranura. Entonces el mecanismo de apertura marrón se acoplará. Para ello, gire el mecanismo de apertura en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se oiga un "click".
4. Presionando el émbolo se mezclará y dispensará el **CORE-FLO DC Lite** (Consulte el apartado «INFORMACIÓN TÉCNICA» para más información sobre los tiempos de trabajo y de fraguado.)

1. REEMPLEMENTO DE MONCONI CON CORE-FLO DC Lite
(Preparación del diente)
(1) Aislar el diente con la ayuda de un dique de goma.
(2) Aplicar un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos de BISCO.
(3) A Si usa una banda matriz: coloque una banda matriz alrededor del diente preparado. Coloque la punta intraoral directamente en la preparación y dispense **CORE-FLO DC Lite**. Fotopolimerizar por 40 secondi.
b. Si usa un molde: coloque la punta directamente en el molde y dispense **CORE-FLO DC Lite**. Posicione el molde con el producto sobre el diente preparado y mantenga la presión hasta que el material haya fraguado.
(4) Prepare y finisce il moncone come da normale procedura usando frese diamantate e carburo.

2. TECNICA DI CEMENTAZIONE DI PERNI E RICOSTRUZIONE DI MONCONI CON CORE-FLO DC Lite
(1) Provare il perno selezionato secondo le istruzioni del produttore di perni.
(2) Applicare un adhesivo in base alle istruzioni del produttore; si raccomanda l'uso di un adesivo BISCO. Prima di fotopolimerizzare, tamponare il canale radicolare con punte di carta. Per ogni canale usare una punta di carta esce dal canale asciutta, quindi asciugare delicatamente l'adesivo con l'aria, in modo da fare evaporare il solvente.
NOTA: L'utilizzo delle punte di carta è importante per la rimozione di residui di materiale adesivo, in modo che non si verifichi la polimerizzazione durante il collocazione in sede del perno.
(3) Rivestire la superficie del perno con adesivo in base alle istruzioni del produttore. Questo aumenterà la bagnabilità del perno.
(4) Inettare **CORE-FLO DC Lite** nel canale radicolare utilizzando l'apposito puntale miscelatore. Iniziare dall'estremità apicale del canale e ritirare il puntale lentamente, mantenendo immerso nel cemento per ridurre al minimo i vuoti.
(5) Rivestire l'estremità apicale del perno con **CORE-FLO DC Lite**. Inserire il perno nel canale con pressione delicata per 20-30 secondi.
(6) Continuare a spingere **CORE-FLO DC Lite** attorno al perno e ricostruire il moncone fino a ottenere l'altezza e la forma desiderate.
(7) Eliminare il materiale in eccesso e fotopolimerizzare per 40 secondi posizionando il puntale curvo il più vicino possibile al perno e al moncone ricostruito.
(8) Preparare e finire il moncone come da normale procedura usando frese diamantate o al carburo.

3. MATERIALE SOSTITUTIVO DELLA DENTINA
(1) Isolare il dente e prepararlo in modo conservativo. Risciacquare e asciugare.
(2) Applicare un adesivo in base alle istruzioni del produttore; si raccomanda l'uso di un adesivo BISCO.
(3) Eroga **CORE-FLO DC Lite** solo fino al livello della dentina sostitutiva. 40 secondi.
(4) Fotopolimerizzare **CORE-FLO DC Lite** per 10 secondi. Continuare a completare il composito fotopolimerizzato, aumentando in modo incrementale fino a riempire la preparazione della cavità. Fotopolimerizzare secondo le istruzioni del produttore.
(5) Controllare l'occlusione e proseguire con le procedure di rifinitura e lucidatura.

IGIENE: Per evitare che il prodotto si indurisca o polimerizzi all'interno della siringa si deve lasciare inserita sulla siringa la cannula di miscelazione fino alla successiva applicazione. Se utilizzata per cavità orale pulire la cannula di miscelazione con disinfettante prima dello stoccaggio.

SMALTIMENTO: erogare per mezzo di un puntale di miscelazione o raccogliere il materiale miscelato in eccesso su una vaschetta di miscelazione. Fotopolimerizzare il materiale in eccesso nelle sezioni fino a completa polimerizzazione. Smaltire il materiale in eccesso e quello polimerizzato conformemente alle norme locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, contattare il produttore.

MANUTENZIONE: conservare il kit a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Per la data di scadenza, vedere le etichette sulla confezione.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino difettosi. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, accidentali o consequenziali derivanti da un'eventuale inadeguatezza del prodotto all'uso previsto prima di utilizzare il prodotto in tale previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità relativi all'uso del prodotto.

* CORE-FLO è un marchio di fabbrica di BISCO, Inc.

Per ordinare gli accessori:
X-81252P – Puntali di miscelazione statica della siringa doppia (30)
X-81253P – Puntali di miscelazione e intraorali della siringa doppia (30)
X-81267P – Puntali di miscelazione e per canale radicolare della siringa doppia (30)

AVVISO: Segnalare qualsiasi incidente grave a BISCO e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si trova l'utente e/o il paziente.

sv CORE-FLO™ DC Lite
Cementmaterial med låg viskositet för uppbyggnad av stumpar

ALLMÄN INFORMATION

CORE-FLO DC Lite är en flytande, dualhärdande radiopak kompost för pelarupplyggnad, särskilt anpassad för stiftcementering (och pelarupplyggnad) i en och samma applikation. **CORE-FLO DC Lite** är speciell avsedd för dentinersättning. **CORE-FLO DC Lite** finns i dubbelsprutor, enkel applikation. **CORE-FLO DC Lite** finns i en vitaktig dentinersättningsmaterial. **CORE-FLO DC Lite** finns i dubbelsprutor, 12 g i Natural/A1 och Opaque White-nyanser. **CORE-FLO DC Lite** är avsedd att användas med ett adhesivsystem som är kompatibel med dualhärdande material säsom samtliga BISCO's adhesiver.

Tänkt brukare: legitimerad tandläkare.

Användningsområden:
De

hr CORE-FLO™ DC Lite
Nekeramička zaštita niskog nagiba za betonske krovove

OPĆE INFORMACIJE

CORE-FLO DC Lite tekuć je dvokomponentni premazni radiopaksni kompozit za nadogradnju postojeće oemišljen za cementne kontrolne i nadograđivanje obrnute strukture u jednoj jednostavnoj primjeni. **CORE-FLO DC Lite** se koristi kao zaštita od vode za betonske krovove. **CORE-FLO DC Lite** izvrsnih je svojstva prianjanja na betonske i bitumenske strukture i pokazuje izvrsnu otpornost na dvostruknu ekspanziju i dvostruku kontrakciju. Dodatnom je prednošću u usporedbi s konvencionalnim sustavima A11 i Opaque White **CORE-FLO DC Lite** je u mogućnosti u potpunosti ukloniti sve postojeće hrapavosti i nepravilnosti na betonu i time ostvariti glatku i ravnu podlogu za primjenu sustava **CORE-FLO DC Lite** te u mnogim slučajevima i izbjeći upotrebu dodatnih slojeva hrapavih materijala, kao bio su BISCO sadrenice.

Predviđeni korisnici: ovlašteni zubni liječnik.

Upute za upotrebu:
Osnovne indikacije za primjenu **CORE-FLO DC Lite** jesu:
1. Materijal za nadograđivanje
2. Cementarnice kutića iz klinova
3. Zaptepski materijal Dentin

Upozorenja:
- Tijekom ovih postupaka treba izbjegavati onečišćenje sitnom, kiselu ili vodom. Pri korištenju zubnih lepila, onečišćenje de umanjiti vezivanje dentina i može dovesti do smanjenje vjerojatnosti zadržavanja.
- Izolacija se preporučuje za sve indikacije gdje postoji mogućnost kontaminacije.

Sigurnosna upozorenja:
- Uporabna kontaminacija: Proizvoć może sadržavati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odobrite nabijeni kontaminirani proizvod. Nemojte ga čistiti, dezinfekcirati ili ponovno koristiti.
- Preporuka se upotrebu uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih oblaga kako bi se izbjeglo onečišćenje štetnim tijelom tekućina. Ako je štetnija kontaminacija, bacite je odmah. Nemojte je čistiti ni dezinficirati.

Mjere oprema:
- Izbjegavajte dodir s kožom; nepolimerizirane (mekt) aktivirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, operite kožu sudom i sapunom.

- Kako biste spriječili polimerizaciju iz zaptepske, prvoj ili fibrijalje za mješanje treba ostati na mjestu sve dok se ne ne upotrebe. Ako se koristi intraoralno, prije primjene treba ga pomjestiti u dezinfekcijsom.

OGLAĐANJE: Izbjegnite kroz ulje za mješanje ili sakupite izvrstan ulje materijala na podlogu za mješanje. Svaku materijal u otpadnoma ovisnika ispitoliću sve dok polimerizira ne otvrdne. Odbacite štrcaljku, vrhove i otvrdnuti materijal sklado s otrednjama zajednice koje se odnose na odlaganje materijala. Ne ispuštajte u okoliš bez prethodnog odredbe koje se odnose na odlaganje otpada.

SKLADIŠTENJE: Čuvati kompletna sobnoj temperaturi (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Pogledajte posebnoje nalepnice komponenata za ordinirane datume isteka.

JAMSTVO: BISCO, Inc. primjenu odgovornost za zamjenu proizvoda u slučaju da su neispravni. Tvrtka BISCO, Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, bilo izravne ili posljedičje, koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja proizvoda kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan odrediti prikladnost proizvoda za svoje posebne namjene. Sve rizike koji prelaze preciznu sav rizik i na odgovornost za gore navedenu.

**CORE-FLO je zaštitni znak tvrtke BISCO, Inc.*

Za ponovno naručivanje pribora:
X-81232P – Statički vrhovi mješalice dvojne štrcaljke (30)
X-81257P – Vrhovi otvaranje mješalice dvojne štrcaljke (30)
X-81267P – Vrhovi dvojne mješalice i štrcaljke za kanal korijena (20)

NAPOMENA: O svim zubnim incidentima izvijestite tvrtku BISCO i nadležnu tijelo državne dionice EU-a u kojoj se nalaze korisnik ili pacijent.

cs CORE-FLO™ DC Lite
Vibrační kompozitní hydraulický dvoukomponentní

OBECNÉ INFORMACE

CORE-FLO DC Lite je tekutý, duálně tvrzený, rentgenkontrastní kompozit pro dostavbu jádra, speciálně navržený pro cementovací fázi a dostavbu struktury jádra při jedné snadné aplikaci. **CORE-FLO DC Lite** je také ideálním materiálem k náhradě destiku. **CORE-FLO DC Lite** se dodává ve dualní stříkačce pro automatické míchání. Jeho dispozicí v odstínech Naturals1 a Nepróchlidá bílá. **CORE-FLO DC Lite** je určen k použití s polymy, které jsou vyrobeny z dvojitých hydrofilní materiály, jako jsou Nejlepší BISCO.

Zamýšlený uživatel: zubní lékař.

Indikace použití:
Hlavní indikace použití **CORE-FLO DC Lite** jsou:
1. Materiál pro zhotovení jádra
2. Cementovací fixaci
3. Materiál pro náhradu dentinu

Varování:
- Nikdy těchto postupů je nutné zamezit kontaminaci jíraem, krví nebo vodou. Při korištenju zubnih lepila, onečišćenje de umanjiti vezivanje dentina i može dovesti do smanjenje vjerojatnosti zadržavanja.
- Izolacija se preporučuje za sve indikacije gdje postoji mogućnost kontaminacije.

Sigurnosna upozorenja:
- Uporabna kontaminacija: Proizvoć może sadržavati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odobrite nabijeni kontaminirani proizvod. Nemojte ga čistiti, dezinfekcirati ili ponovno koristiti.
- Preporuka se upotrebu uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih oblaga kako bi se izbjegao onečišćenje štetnim tekom tekućina. Ako je štetnija kontaminacija, bacite je odmah. Nemojte je čistiti ni dezinficirati.

Mjere oprema:
- Izbjegavajte dodir s kožom; nepolimerizirane (mekt) aktivirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. U slučaju dodira, operite kožu sudom i sapunom.
- Kako biste spriječili polimerizaciju iz zaptepske, prvoj ili fibrijalje za mješanje treba ostati na mjestu sve dok se ne ne upotrebe. Ako se koristi intraoralno, prije primjene treba ga pomjestiti u dezinfekcijsom.

OGLAĐANJE: Izbjegnite kroz ulje za mješanje ili sakupite izvrstan ulje materijala na podlogu za mješanje. Svaku materijal u otpadnoma ovisnika ispitoliću sve dok polimerizira ne otvrdne. Odbacite štrcaljku, vrhove i otvrdnuti materijal sklado s otrednjama zajednice koje se odnose na odlaganje materijala. Ne ispuštajte u okoliš bez prethodnog odredbe koje se odnose na odlaganje otpada.

SKLADIŠTENJE: Čuvati kompletna sobnoj temperaturi (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Pogledajte posebnoje nalepnice komponenata za ordinirane datume isteka.

JAMSTVO: BISCO, Inc. primjenu odgovornost za zamjenu proizvoda u slučaju da su neispravni. Tvrtka BISCO, Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, bilo izravne ili posljedičje, koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja proizvoda kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan odrediti prikladnost proizvoda za svoje posebne namjene. Sve rizike koji prelaze preciznu sav rizik i na odgovornost za gore navedenu.

**CORE-FLO je zaštitni znak tvrtke BISCO, Inc.*

Opětovné objednání příslušenství:
X-81252P – statické mícháci špičky pro duální stříkačku (30)
X-81257P – mícháci a intraorální špičky pro duální stříkačku (30)
X-81267P – mícháci a kořenové špičky pro duální stříkačku (20)

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli zákonné mimořádné události ohlaste společnosti BISCO a příslušnému orgánu v členském státě EU, kde uživatel nebo pacient sídlí.

et CORE-FLO™ DC Lite
Vibreerimisele hakkavad hüdraulilised tihendusmassid

ÜLDINE TEAVE

CORE-FLO DC Lite on voolav, kaksikhõstuvu, röntgenkontrastne kompositmaterjal hambakõvaduse taastamiseks, mis on spetsiaalselt mõeldud tsementimiseks ja hambakõvaduse struktuuri taastamiseks ühe lihtsa aplikatsioonina. **CORE-FLO DC Lite** sobib suurepäraselt ka dentiini asendamiseks. **CORE-FLO DC Lite** tugevad omadused ühendumiseks nii betoonist kui ka bituumenist ja see on suurepäraselt vastupidav kahekordsele paisumisele ja kahekordsele kokkutõmbumisele. Lisaeelisena võrreldes konventsionaalse A11-ga ja opaak-valge aplikatsioon kapitolil. A. **CORE-FLO DC Lite** ei pareddita lekitanud ar saatelvu, kas ei saatelga ar dvöljäd cietrolitem materialiem, piemēram, BISCO adhezīvam.

Paredzētais lietotājs: sertificēts zobārsts.

Lietošanas norādījumi:
Galvenās **CORE-FLO DC Lite** lietošanas indikācijas ir šādas:
1. Materiāls veidošanai
2. Cementēšanas fixēšanas
3. Dentīna aizstāšanas materiāls.

Brīdinājumi:
- Šo procedūru laikā jāizvairās no piesārņojuma ar sekaliem, ūdeni vai siekalām. Pielietojot dentīnam adhezīvus, piesārņojums pasliktināta dentīna saistīšanās var samazināt iespējamās ilgtermiņa.
- Ģumijas norobežojums ir ieteicams visām indikācijām, kurās pastāv piesārņojuma risks.

Blīstambas piesardzības:
- Izvairieties no saskares ar ādu; nepolimerizētās (mekt) aktivētās smēles var izraisīt jutīgām personām jutīgumu. Saskares gadījumā mazgāt ar ziepēm un ūdeni.
- Lai novērstu polimerizāciju no ieņemšanas, pirmo fibrijas vai ieņemšanas vajadzēs ārpus ūdens. Ja tiek izmantots intraorāli, notīrīt sajaukšanas uzgaļi ar dezinfekcijas līdzekli pirms nometināšanas gādāšanas.
- Atšķirīgā no Biosco adhezīvem, ne visas vielas nepieciešams sajaukt ar paplašinātāju. Vēlamās vielas ieteicams sistēmas saasināta ar paciešanām vai divkārši polimerizējas. Ja izvēlaties no jebkādas līgošu pieskārušas ārstēšanas laikā, ietekams izmantot parasti pieejamos frigēnieka izolācijas līdzekļus. Ja tek cīnaināts intraorāli, notīrīt sajaukšanas uzgaļi ar dezinfekcijas līdzekli pirms nometināšanas gādāšanas.

UTILIZĀCIJA: Izspiedieti caur sajaukšanas uzgaļi vai savāciet sajaukšanas uzgaļa materiālu uz sajaukšanas paliktņa. Ciešanām ļaujiet haosmair ekaitēm tārsās ešīs ārstēšanas. Utilizēt šķirsu, uzgaļus un sacietējušos materiālus saskaņā ar pakārtotās sēnīti esošajiem ārkārtīgu utilizācijas noteikumiem. Ja tādu nav, ievērot vietējā sadīkā ārkārtīgu apsaimniekošanas noteikumus.

UZGLABĀŠANA: Glabāt komplektu istabas temperatūrā (20–25 °C). Skatīt atsevišķās nalepes, lai uzzinātu notekšanas datumus.

GARANTIJA. BISCO, Inc. apņemas savu atbildību par produktu nomaiņu, ja tiem tiek konstatēti defekti. BISCO, Inc. neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ar tiešiem, ne izvēstiem, kas izdēlies no produkta lietošanas vai nespējas to ieņēmt kā aprakstīts. Lietotāja atbildība ir pirms ieņēmas noteikt produkta piemērotību šī paredzētajam pielietojumam. Lietotāja uzņemas visu to saistīto risku un atbildību.

**CORE-FLO ir zīmju tēls BISCO, Inc.*

Pakaitinės užsakymo reikmenys:
X-81252P – dvigubo švirkšto mišinio maišymo antgalai (30)
X-81257P – dvigubo švirkšto mišinio ir intraoralinio antgalai (30)
X-81267P – dvigubo švirkšto mišinio ir šaknies kanalo antgalai (30 vnt.)

PASTABA. Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite bendrovei „BISCO" ir vartotojo ir (arba) paciento ES šalies narės kompetentingai institucijai.

hu CORE-FLO™ DC Lite
Vibrációs hidraulikus fogtömőanyag

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A **CORE-FLO DC Lite** egy folyékony, kettős kötésű, röntgen csontkitöltő kompozit, amelyet kifejezetten csapos beragasztásra és a csontszerkezet egyszerűen, egyszerű felépítésére tervezve. A **CORE-FLO DC Lite** kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik mind betonon, mind bitumenen, és kétszeres duzzadás és kétszeres zsugorodás ellen is szilárdan ellenáll. A **CORE-FLO DC Lite** egy olyan kétkomponensű anyag, amely lehetővé teszi a szükséges dentinhelyettesítő anyagok egyszerű felhasználása. A **CORE-FLO DC Lite** a Naturals1 és a Nem-fehérítő árnyalatban kapható. A **CORE-FLO DC Lite** olyan polimerekkel kompatibilis, amelyek hidrofil anyagokat, mint pédáulszerint a BISCO bondok.

Célfelhasználó: okleveles fogorvos.

Felhasználási javaslat:
A **CORE-FLO DC Lite** használatának fő indikációi a következők:
1. Csonkkitöltő anyag
2. Kálcsap és csapcement
3. Dentinpótló anyag

Figyelmeztetések:
- A nyálat, vérrel vagy vízzel való szennyeződés kerülése ezen eljárások alatt. Fogászati adhezívek használata esetén a szennyeződés veszélyezteti a dentinkötés és a rákötés hatékonyságát és szilárdságát.
- Minden olyan esetben, amikor szennyeződés forulhat elő, ajánlott kofferdam jumi használata.

Figyelmeztetések:
- Kémiai szennyeződés: A termék egyszer használatos részeket tartalmazhat. Artalmatlanítsa a használt vagy szennyeződött terméket! Ne tisztítsa meg, ne fertőtlenítse, és ne használja újra.
- Javaslat a higiénikus gyártási gyakorlat szerinti higiénikus eldobhatóanyagok alkalmazása a fecskendő, az ujjak és a szemek szennyeződés kockázatának szennyeződést fecskendőket ártalmatlanítani kell. Ne tisztítsa meg ne ne fertőtlenítse azokat.

Óvintézkedések:
- Kerülje a bőrrel való kontaktust; az érzékeny szenzibilizáció a polimerizálatlan (mektaktivált gyantát is bőr érzékenységet okozhat. Ha bőre kerül, mossa le a bőrt szappanban és vízzel.
- A polimerizáció megelőzése érdekében a fibrillát a kevertetés fecskendő kevertetőben kell tartani. Intraorálisan szükséges esetén a kevertető helyettesítése szükséges.

ÁTVÉTELI: Ha a BISCO, Inc. szállítja a termékeket, az ellátás és a felelősség az a BISCO, Inc. szabályzata szerint van. A BISCO, Inc. nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett jellegű kárért vagy veszteségért, ami a termékek ismertetett módon történő felhasználása során vagy használhatatlansága miatt következik be. Az ügyfélnek felelősége és felelősége a termék és/vagy felhasználási feltételek megfelelőségének megállapítása. A felhasználó vállalja a kockázat kapcsolatos valamennyi rizikókat és felelősséget.

**A CORE-FLO A BISCO, Inc. védjegye.*

Tartozékok újrarendeléshez:
X-81252P – Kettős fecskendő statikus keverőcsövek (30 darab)
X-81257P – Kettős fecskendő keverőcsövek és intraorális végződések (30 darab)
X-81267P – Kettős fecskendő keverőcsövek és gyökércsatorna-végződések (30 darab)

FIGYELEM: Jelentsen minden súlyos eseményt a BISCO vállalatnak és azon európai tagállam illetékes hatósága felé, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

lt CORE-FLO™ DC Lite
Vibruojantis hidraulinis dvikomponentinis

BENDROJI INFORMACIJA

CORE-FLO DC Lite yra tekstinė, dvejopo kietinimo, rentgenokontrastinis skirtas formavimo kompozitas, specialai sukurtas kaištiniams cementuoti ir dentino struktūrai formuoti viena paprasta operacija. **CORE-FLO DC Lite** taip pat yra puiki pakaitinė dentino medžiaga. **CORE-FLO DC Lite** tiek pagrindo automobilio kompozitas ir bitumenas, ir jis yra puikiai atsparus dvigubai ekspansijai ir dvigubai traukimui. Papildomas privalumas, palyginus su A11 ir pagrindinis Opaque White **CORE-FLO DC Lite** yra galimybė visiškai pašalinti bet kokias nelygumus ir netolygumus betone ir taip pasiekti lygią ir tolygią paviršių, kad galėtumėte naudoti **CORE-FLO DC Lite** sistemą ir dažnai net išvengti papildomų šiurkščiųjų medžiagų, tokių kaip BISCO sadrinės medžiagos.

Numatytasis naudotojas – licencijuotas odontologas.

Naudojimo indikacijos
Pagrindinės **CORE-FLO DC Lite**' naudojimo indikacijos:
1. Sertifes formavimo medžiaga
2. Kaištinės ir cementinės medžiagos
3. Dentino pakaitinė medžiaga

Įspėjimai
- Šiuose darbo procedūrose reikia vengti užterštimo seilėmis, vandeniu ar kraujo. Naudojantis dentino sukibimu ir surišimuose gali sumažėti ilgesnis.
- Kai įmanomas užterštimas, rekomendijuojama naudoti kofferdam.

Perspėjimai
- Informacija užterštimas. Gaminyje gali būti vienkartinio naudojimo elementų. Pašalinkite panaudotos arba užterštas medžiagas. Nevartokite nedezinfekuotos ir nenaudokite pakartotinai.
- Rekomenduojamas dažnai gausybė grąsnyje higieninių uždangalų, kad per procedūrą neužterštumėte kivitlis. Užterštą žiūrėkite. Nevartokite nedezinfekuotiems.

Priemonės atsargumo
- Vengti kontakto su oda; nepolimerizuotos (metakrilatas) šios formavimo medžiagos gali sukelti jautrumą. Sukaitus arvuo odą nuplaukite muilu ir vandeniu.
- Kad būtų galima sumažinti polimerizacijos galimybė, dvigubo švirkšto mišinys antgal reikia palikti vietoje iki jo naudojimo. Rekomendojama naudoti intraoraliniam naudojimui, jei reikia, pakeisti kitu neužterštumo švirkštu. Po naudojimo burnoje, prieš paėdžiami (vieta, metymo antgal) nuvalykite dezinfekavimo priemone.

ĮSIMTINAS. Išspauskite pro maišymo antgal arba surinkite sunaudotą medžiagą perteikę ant maišymo padėklo. Medžiagos perteikę, dalinis vaikiai sukietinkite šviesa. Švirkštą, antgalus ir sukietintą medžiagą išmeskite pagal bendrinio nuostatas dėl atliekų. Jei jos neapibrėžtos, kreipkitės dėl vietinės atsakingo už atliekas tvarkymo.

LAIKYMAS. Rinkinį laikykite kambario temperatūroje (20°C - 68°F – 25°C / 77°F). Kiekvieno komponento gamybos datos nurodytos ant jo etikečių.

GARANTIJA. Bendrovė „BISCO, Inc." prisima atsakomybę pakeisti gaminius, jeigu bus įrodyta, kad jie turi trūkumų. Jeigu gaminys naudojamas neatsakant nurodymus, bendrovė „BISCO Inc." neprisima atsakomybės už patirtus tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar žalą. Prieš naudodamas vartotojas privalo nustatyti, ar gaminys tinka numatomam naudojimo tikslui. Vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

**CORE-FLO yra brendas „BISCO, Inc." prekės ženklas.*

Papildomi užsakymai:
X-81252P – statiniai maišymo antgaliai (30 vnt.)
X-81257P – dvigubo švirkšto ir intraoraliniai antgaliai (30 vnt.)
X-81267P – dvigubo švirkšto ir šaknies kanalo antgaliai (30 vnt.)

PRANEŠKITE APIE ĮVYKUSIUS ĮVYKIUS Visi rimtesni incidentai turėtų būti pranešti „BISCO" ir atitinkamai ES narės kompetentingai institucijai, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas ES šalies narės kompetentingai institucijai.

mk CORE-FLO™ DC Lite
Вибрирачки хидраулички двокомпонентен

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

CORE-FLO DC Lite е течен, двојно стврднат, радиоконтрастен композит за полнење дадени специјалниот дизајниран за цементирање копје и за полнење на дентинот структура со една едноставна примена. **CORE-FLO DC Lite** е исто така идеален материјал за замена на дентин. **CORE-FLO DC Lite** се доставува во двојна шприц за автоматско мешање и е достапен во Naturals1 и Непрозирна бела. **CORE-FLO DC Lite** е погоден за употреба со полимери кои се изработени од хидрофилни материјали, како на пример Best BISCO.

Наменски корисник: лиценцираниот заболувач.

Упатства за употреба:
Основните индикации за употребата на **CORE-FLO DC Lite** се:
1. Материјал за изградба
2. Цементирање на копје
3. Материјал за пополнување на дентин

Предупредувања:
- Треба да се избегнува контаминација со пљувачка, крв или вода во текот на овие постапки. При користење адхезиви за дентин, контаминацијата со загреди овојствата на дентинот и може да доведе до намалена веројатност за задржување.
- Се препорачува изолација на тенка за гранка на сите индикации кои можат да дојдат до контаминација.

Безбедносни предупредувања
- Контаминација на производот: Производот може да содржи елементи кои се наменети за еднократна употреба. Ако е контаминиран, не дезинфектирајте ја ни повторно.
- Препорачуваме да се користат стандардни заштитни обложувачи кои се достапни за да се избегне контаминација со штетна течност. Ако е контаминацијата штетна, фрлете ја веднаш. Не ја чистете ни дезинфектирајте.

Мерки на претпазливост:
- Избегнете контакт со кожата; нелинеаризираните смоли (мек) кои се активирани може да предизвикаат чувствителност кај луѓето кои се чувствителни. Ако дојде до контакт, измијте ја кожата со сапун и вода.
- За да се спречи полимеризација, фибрилата треба да остане на мешалката додека е подготвена за употреба. Ако се употребува интраорално, пребројте го врвот на мешалката со дезинфекциско средство пред отстранување.

ОГЛАСУВАЊЕ: Ја избегнете преку ја ја ја